


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



БАРС®
СОЯ



50 ц/га
потенциальная
урожайность



Высокое содержание белка,
заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)



Регион допуска
6, 8, 12



Группа спелости
Средняя

Преимущества

Повышенная для своей группы
спелости урожайность,
засухоустойчивость,
сверхранние сроки посева

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию



Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 115 (45°)

Содержание белка, % 45

Масличность, % 22

Масса 1000 семян, г 185

Высота растения, см 90-110

Высота прикрепления нижнего боба, см 14-16

Особенности

Сорт характеризуется холодоустойчивостью (до минус 5 °С), более глубокой корневой системой. Помимо указанных регионов допуска пригоден для возделывания в областях с развитыми системами орошения в центральной и южной частях Казахстана на 44-50° северной широты, а также всей территории Узбекистана и Киргизии

Урожайность в производственных посевах

● Краснодарский край
48,8 ц/га



● Ставропольский край
40,7 ц/га

● Ростовская область
39,7 ц/га