

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



40 ц/га
потенциальная
урожайность

 **Холодоустойчивость**


 **Регион допуска**
6, 8

 **Группа спелости**
Ранняя


Преимущества

Устойчивость к растрескиванию бобов и полеганию при созревании, высокое прикрепление нижнего боба

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	108 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	180
Высота растения, см	90-110
Высота прикрепления нижнего боба, см	12-15

Особенности

При оптимальных сроках посева в условиях Краснодарского края созревает во II-III декадах августа. Толерантен к стрессовым факторам. Сорт среднерослый, семена жёлтого цвета, среднего размера, с желтым рубчиком

Урожайность в производственных посевах

● **Краснодарский край**
39,5 ц/га



● **Саратовская область**
28,8 ц/га

● **Республика Калмыкия**
23,2 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

12