

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ВИЛАНА®
СОЯ

57 ц/га
потенциальная
урожайность



Отзывчивость на высокий агрофон
и орошение



Регион допуска
6



Группа спелости
Средняя

Преимущества

Высокая отзывчивость на улучшение условий выращивания. В оптимальных условиях возделывания формирует высокие урожаи семян гетерозисного уровня

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Характеристики


Вегетационный период, сут.	125 (45°)
Содержание белка, %	42
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	160
Высота растения, см	100–115
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в середине сентября. Устойчив к ложной мучнистой росе и пепельной гнили. Оптimalен для богарного возделывания в предгорной зоне Северного Кавказа

Урожайность в производственных посевах

● **Краснодарский край**
57,0 ц/га



● **Ставропольский край**
47,1 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

8