

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



36 ц/га
потенциальная
урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость


Регион допуска
5, 6, 8, 10, 12

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества

Пригодность к повторным летним посевам на юге России на фоне укорачивающихся длин дня

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз




Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	100 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	150
Высота растения, см	80–90
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Благодаря короткому вегетационному периоду сорт способен «уходить» от засух второй половины лета. В Краснодарском крае созревает в I–II декадах августа. Устойчив к полеганию и растрескиванию бобов

Урожайность в производственных посевах

● Воронежская область
27,6 ц/га

● Ростовская область
28,6 ц/га

● Липецкая область
31,0 ц/га

● Волгоградская область
29,2 ц/га

