



НИЛИН[®]
МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН



21 ц/га
потенциальная
урожайность



Изменённый жирно-кислотный
состав масла



Регион допуска
4, 5, 6, 7, 10



Группа спелости
Средняя

Преимущества

Масло сорта – альтернатива
подсолнечному. Высокая
оксидостабильность за счет
низкого содержания
линоленовой кислоты
в масле 2,9 %



Оптимальная густота стояния
находится в диапазоне 600–900 шт/м²
в зависимости от региональных
рекомендаций по возделыванию

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к осыпанию



Устойчивость к засухе



Устойчивость к болезням

Фузариоз



Антракноз



Полиспороз



Бактериоз



Характеристики

Вегетационный период, сут.	90
Масличность, %	46
Масса 1000 семян, г	5,3
Высота растения, см	85

**Цвет
семян**




**Цвет
лепестков**



Особенности

Низкое содержание линоленовой кислоты в масле (2,9 % против 68 % у сорта-стандарта), повышенная оксидостабильность предопределяет его использование на пищевые цели. Масло сорта является альтернативой подсолнечному, т.к. его можно выращивать в регионах, где не растет подсолнечник. Сорт быстро развивается на ранних этапах вегетации

Урожайность в производственных посевах



● **Ставропольский край**
20,7 ц/га