

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ПАРУС®
СОЯ

38 ц/га
потенциальная
урожайность



Раннее созревание, высокорослость



Регион допуска

5, 6, 8




Группа спелости

Ранняя

Преимущества

Непродолжительный
вегетационный период,
засухоустойчивость

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 105 (45°)

Содержание белка, % 43

Масличность, % 23

Масса 1000 семян, г 170

Высота растения, см 105-115

Высота прикрепления нижнего боба, см 13-15


Особенности

Короткий вегетационный период позволяет получать семена без искусственной досушки и своевременно готовить почву под посев озимых колосовых культур. При оптимальных сроках посева в условиях Краснодарского края созревает во II-III декадах августа. Растения устойчивы к полеганию и растрескиванию бобов

Урожайность в производственных посевах

● **Краснодарский край**

35,1 ц/га



● **Курская область**

28,9 ц/га

● **Воронежская область**

27,4 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

12