

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ВНИИМК



ЧАРА®

СОЯ

41 ц/га

потенциальная
урожайность



Засухоустойчивость и отзывчивость
на орошение



Регион допуска

6, 8



Группа спелости

Ранняя


Преимущества

Высокая технологичность,
устойчивость к полеганию
и растрескиванию бобов
при созревании

Устойчивость к полеганию




Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 115 (45°)

Содержание белка, % 42

Масличность, % 22

Масса 1000 семян, г 160

Высота растения, см 110-125

Высота прикрепления нижнего боба, см 13-15


Особенности

В Краснодарском крае при оптимальных сроках посева созревает в конце августа. Формирует рентабельные урожаи зерна в засушливые годы. Устойчив к ложной мучнистой росе и пепельной гнили

Урожайность в производственных посевах

● Краснодарский край

36,2 ц/га



● Ставропольский край

41,0 ц/га

● Кабардино-Балкарская Республика

40,1 ц/га