



ВНИИМК

СОЯ

Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Федеральный научный центр
«Всероссийский научно-исследовательский институт
масличных культур имени В.С. Пустовойта»

СОЯ ОЧЕНЬ РАННЕЙ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ

- Сорты сои ВНИИМК созданы традиционными методами селекции (нетрансгенные) на основе собственных уникальных разработок, а также лучших отечественных и зарубежных селекционных достижений. Отселектированы на повышенную урожайность и адаптивность к условиям недостаточного увлажнения юга России, засухоустойчивы, устойчивы к болезням. Одновременно отзывчивы на оптимальные условия увлажнения и орошения
- Предназначены для выращивания в основных и повторных посевах, для пересевов других культур, пригодны для выращивания в короткоротационных (2-4-польных) севооборотах и при монокультуре
- Разнообразны по срокам созревания — очень ранние, ранние, среднеранние и средние (среднеспелые)
- Характеризуются высокой потенциальной семенной продуктивностью и технологичностью при возделывании и уборке
- Обеспечивают высокую эффективность использования сои как предшественника озимых колосовых культур и риса
- Обеспечивают высокую рентабельность производства культуры

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ СОИ

Сорт	Вегетационный период, сутки	Потенциальная урожайность, т/га	Содержание белка, %	Высота, см	
				растения	прикрепления нижнего боба
★ Баргузин	90—96	3,0—4,0	40—41	65—78	13—15
Пума	91—98	2,7—3,6	40—43	75—95	13—15
Лира	92—98	2,6—3,2	40—43	75—85	13—14
Вита	92—96	2,7—3,6	40—43	78—85	13—15

★ - НОВИНКА



ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ СОИ СЕЛЕКЦИИ ВНИИМК ПО ИХ ПРИГОДНОСТИ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ

Сорт	Регион допуска	Зоны возможного возделывания	Срок созревания в зоне возможного возделывания
★ Баргузин	6 (Северо-Кавказский) 5 (Центрально-Черноземный) 7 (Средневолжский) 9 (Уральский) 11 (Восточно-Сибирский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднераннего (Воронеж, Белгород) до среднего (Курск, Липецк)
		6 (Северо-Кавказский)	От очень раннего (Краснодар, Ставрополь) до среднераннего (север Ростовской обл.)
		7 (Средневолжский)	От среднераннего (Пенза, Самара) до среднего (Саранск, Ульяновск) и среднепозднего (Казань)
		8 (Нижневолжский)	От очень раннего (Астрахань) до раннего (Волгоград) и среднераннего (Саратов)
		9 (Уральский)	От среднераннего (Оренбург) до среднего и среднепозднего (Курган, Уфа, Челябинск)
		10 (Западно-Сибирский)	От раннего (Алтай) до среднего (Омск), и среднепозднего (Кемерово)
		11 (Восточно-Сибирский)	От среднего (Абакан, Иркутск), до среднепозднего (Красноярск)
Пума	6 (Северо-Кавказский) 5 (Центрально-Черноземный)	6 (Северо-Кавказский)	От очень раннего (Краснодар, Ставрополь) до среднераннего (север Ростовской обл.)
		5 (Центрально-Черноземный)	От среднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От раннего (Астрахань) до среднего (Волгоград, Саратов)
		10 (Западно-Сибирский)	От среднего (Алтай) до позднего (Омск)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до среднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)
Лира	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От раннего (Астрахань) до среднего (Волгоград, Саратов)
		10 (Западно-Сибирский)	От среднего (Алтай) до позднего (Омск)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до среднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)
Вита	6 (Северо-Кавказский) 5 (Центрально-Черноземный) 8 (Нижневолжский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От раннего (Астрахань) до среднего (Волгоград, Саратов)
		6 (Северо-Кавказский)	От очень раннего (Краснодар, Ставрополь) до среднераннего (север Ростовской обл.)



СОЯ РАННЕЙ ГРУППЫ СПЕЛОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ СОИ

	Сорт	Вегетационный период, сутки	Потенциальная урожайность, т/га	Содержание белка, %	Высота, см	
					растения	прикрепления нижнего боба
★	Кора	95—100	2,7—3,6	41—43	90—95	13—14
	Дуниза	100—108	2,8—3,3	40—43	90—100	13—15
★	Парус	102—106	3,6—3,8	41—43	105—115	13—15
	Олимпия	102—108	3,1—4,2	40—42	80—90	13—15
	Селена	102—108	2,9—3,8	40—43	95—05	13—15
	Славия	103—108	3,2—4,0	40—43	110—125	15—16
	Дуар	104—110	3,2—4,0	40—42	100—115	13—15
	Ирбис	105—112	3,4—4,5	44—46	95—115	14—16
	Чара	108—113	3,1—4,1	40—42	110—125	13—15

★ - НОВИНКА

Сорт	Регион допуска	Зоны возможного возделывания	Срок созревания в зоне возможного возделывания
★ Кора	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднепозднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднего и среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до среднепозднего (Хабаровск)
Дуниза	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднепозднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижеволжский)	От раннего (Астрахань) до среднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до среднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)
★ Парус	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднепозднего (Воронеж, Белгород) до очень позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до среднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ СОИ СЕЛЕКЦИИ ВНИИМК ПО ИХ ПРИГОДНОСТИ К ВОЗДЕЛЫВАНИЮ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РФ

Сорт	Регион допуска	Зоны возможного возделывания	Срок созревания в зоне возможного возделывания
Олимпия	6 (Северо-Кавказский) 8 (Нижневолжский)	8 (Нижневолжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднего и среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего (Хабаровск)
Селена	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднепозднего (Воронеж, Белгород) до позднего и очень позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднего и среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до среднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)
Славия	6 (Северо-Кавказский) 5 (Центрально-Черноземный) 8 (Нижневолжский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднепозднего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до среднепозднего (Хабаровск)
Дуар	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	От среднераннего (Воронеж, Белгород) до позднего (Курск, Липецк)
		8 (Нижневолжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до среднепозднего (Хабаровск) и позднего (Благовещенск)
Ирбис	6 (Северо-Кавказский) 5 (Центрально-Черноземный)	6 (Северо-Кавказский)	От раннего (Краснодар, Ставрополь) до среднего (север Ростовской обл.)
		5 (Центрально-Черноземный)	От среднего (Белгород) до среднепозднего (Воронеж) и позднего (Курск)
		8 (Нижневолжский)	От раннего (Астрахань) до среднего (Волгоград) и позднего (Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего (Хабаровск)
Чара	6 (Северо-Кавказский)	5 (Центрально-Черноземный)	Поздний (Воронеж, Белгород)
		8 (Нижневолжский)	От среднего (Астрахань) до позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От раннего (Приморье) до позднего (Хабаровск)

СОЯ СРЕДНЕСПЕЛОЙ ГРУППЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА СОРТОВ СОИ

Сорт	Вегетационный период, сутки	Потенциальная урожайность, т/га	Содержание белка, %	Высота, см	
				растения	прикрепления нижнего боба
Иней	108—114	4,5—5,0	41—43	110—120	14—16
Барс	114—117	4,5—5,0	42—45	90—110	14—16
Зара	114—118	3,8—5,2	40—43	100—25	14—16
Весточка	115—123	3,6—4,2	40—42	110—125	14—16
Вилана	117—120	3,8—5,7	40—42	100—115	14—16
Вилана бета	117—121	2,9—3,2	40—42	110—120	14—16

★ - НОВИНКА

Сорт	Регион допуска	Зоны возможного возделывания	Срок созревания в зоне возможного возделывания
Иней	6 (Северо-Кавказский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до очень позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего и очень позднего (Хабаровск)
Барс	6 (Северо-Кавказский) 8 (Нижеволжский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до среднепозднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до среднепозднего (Хабаровск)
Зара	6 (Северо-Кавказский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до очень позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего и очень позднего (Хабаровск)
Весточка	6 (Северо-Кавказский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до очень позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего и очень позднего (Хабаровск)
Вилана	6 (Северо-Кавказский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до очень позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего и очень позднего (Хабаровск)
Вилана бета	6 (Северо-Кавказский)	8 (Нижеволжский)	От среднераннего (Астрахань) до очень позднего (Волгоград, Саратов)
		12 (Дальневосточный)	От среднераннего (Приморье) до позднего и очень позднего (Хабаровск)

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОИ

7 ШАГОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УРОЖАЯ!

1

ЛУЧШИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ:

Озимые колосовые
Рис



2

ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ:

2-кратное дискование стерни
Отвальная вспашка (20–22 см) или
безотвальное рыхление (30–35 см)
Предпосевная культивация (4–6 см)



3

ПОСЕВ ЛУЧШИХ СЕМЯН ВНИИМК С НОРМОЙ ВЫСЕВА ТЫС. ШТ. НА 1 ГА

Лира – 550–700
Славия, Чара, Олимпия – 500–600
Вилана – 400–500



4

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ КЛУБЕНЬКОВЫХ БАКТЕРИЙ

Обязательно!



5

СПОСОБ ПОСЕВА:

Обычный рядовой (15 см)
Широкорядный (45 или 75 см)



6

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ, СОРНЯКАМИ И БОЛЕЗНЯМИ

Необходимо!



7

УБОРКА ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!



**ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
СЕМЯН ОБРАЩАТЬСЯ:**

350038, г. Краснодар
ул. им. Филатова, д. 17
Тел.: 8 (861) 259-15-14,
8 (861) 275-85-13,
8 (800) 700-75-85
semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru

