


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



52 ц/га
потенциальная
урожайность

 Устойчивость к засухе и холоду


 **Регион допуска**
6

 **Группа спелости**
Средняя


Преимущества

Сверххранение сроки посева, холодоустойчивость до минус 5 °С, слабая реакция на длину дня

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	115 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	22
Масса 1000 семян, г	170
Высота растения, см	100–125
Высота прикрепления нижнего боба, см	14–16

Особенности

Высокорослый сорт, адаптирован к возделыванию в заслушливых условиях. Устойчив к полеганию и растрескиванию бобов при перестое. Высокотехнологичен. Созревает в условиях Краснодарского края в I–III декадах сентября

Урожайность в производственных посевах

● **Краснодарский край**
36,0 ц/га



● **Ставропольский край**
43,1 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

8, 12