

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ИРБИС®
СОЯ



45 ц/га
потенциальная
урожайность



Заморозкоустойчивость (до минус 5 °С),
фотонейтральность



Регион допуска
5, 6




Группа спелости
Ранняя


Преимущества

Высокое содержание белка
в семенах, высокая
урожайность, устойчивость
к стрессовым условиям

Устойчивость к полеганию




Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 112 (45°)

Содержание белка, % 46

Масличность, % 21

Масса 1000 семян, г 175

Высота растения, см 95-115

Высота прикрепления нижнего боба, см 14-16

Особенности

Высокотехнологичный сорт, устойчивый к засухе, холоду. В фазе всходов выдерживает заморозки на почве до минус 5 °С. Слабо реагирует на укороченные длины дня, пригоден для очень ранних посевов — на месяц раньше оптимальных сроков

Урожайность в производственных посевах

● **Краснодарский край**
57,0 ц/га на орошении



● **Ставропольский край**
33,0 ц/га

● **Курская область**
35,0 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

8, 12