

Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ЛИПЧАНКА

СОЯ

40 ц/га

потенциальная
урожайность



Повышенная холодостойкость



Регион испытания

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



Группа спелости

Очень ранняя

Преимущества

Повышенная
холодоустойчивость
и пониженная реакция на длину
дня, короткий вегетационный
период

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию



Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 105 (52°)

Содержание белка, % 41

Масличность, % 23

Масса 1000 семян, г 160

Высота растения, см 75-85

Высота прикрепления нижнего боба, см 13-15


Особенности

Очень ранний тип, но при выращивании его в 3, 4, 5, 7, 9 и 10 регионах допуска время созревания изменится до среднего в южной и до позднего – в северной части зон соеводства этих регионов. Пригоден для повторных летних посевов в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах допуска после уборки озимых колосовых без существенной потери высоты растений

Урожайность в экологическом сортоиспытании

● Липецкая область

32,0 ц/га



● Воронежская область

25,1 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

11, 12