


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ВНИИМК



НОВИНКА



ЛЮБАВА®
СОЯ

44 ц/га

потенциальная
урожайность



Устойчивость к засухе и холоду



Регион допуска

6, 8




Группа спелости

Ранняя


Преимущества

Повышенная засухоустойчивость за счёт глубокой корневой системы (до 2,2-2,4 м), отзывчивость на улучшение влагообеспеченности

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию




Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 114 (45°)

Содержание белка, % 40

Масличность, % 23

Масса 1000 семян, г 140

Высота растения, см 90-115

Высота прикрепления нижнего боба, см 13-15

Особенности

Высокорослый сорт, обладает повышенной для своей группы созревания урожайностью. За счёт пониженной фотопериодической чувствительности пригоден для повторных летних посевов после уборки озимых колосовых культур без существенного снижения высоты растений

Урожайность в производственных посевах

● Краснодарский край

44,0 ц/га

● Республика Калмыкия

25,8 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

12