ВНИИМК

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН



СОРТА

МАСЛИЧНЫЙ ЛЁН

- Устойчив к фузариозу, биотическим и абиотическим факторам среды
- Обладает стабильным урожаем, хорошо отзывается на высокий агрофон
- Выравнен по высоте растений, дружности цветения и созревания
- Засухоустойчив, технологичен, надежен

Сорт	Вегетационный период, сутки	Высота растения, см	Масса 1000 семян, г	Масличность семян, %	Потенциальная урожайность, ц/га	Регионы допуска
Авангард	95	70	7,5	51	28	4, 5, 6, 8, 9
Август	90	70	8,1	53	27	4, 7—10
Амбер	95	75	6,0	47	28	4, 9, 10
НОВИНКА! **Ангелит***	83	65	6,4	48	29	5—8, 10
НОВИНКА! **Бархан**	90	60	6,4	48	30	3, 5—11
Бирюза	90	70	6,7	51	26	9, 10
ВНИИМК 620 ФН	85	68	6,8	50	27	4—11
Даник	85	75	7,5	51	27	5, 6, 9, 10
НОВИНКА! **Лазурит***	83	70	6,8	49	28	5—8, 10
Нилин	90	85	5,3	46	21	4—7, 10
Радуга	85	75	8,0	50	25	4, 5, 6, 8
РФН	85	65	6,5	50	27	4, 5, 10
Сания	95	65	8,5	54	24	4—8, 10, 11
Светлячок	75	55	8,0	51	20	4, 5, 6, 8
НОВИНКА! **Северный 22**	90	55	9,0	51	26	4—10
Снегурок	240 / 85	78	6,2	43	27	все регионы РФ
НОВИНКА! **Фианит**	95	70	7,8	50	30	5—8
ФЛИЗ	85	73	8,0	51	27	4—10
НОВИНКА! **ФЛИЗ ЗУ**	85	62	7,7	48	28	3—6, 8, 9, 11
Ы 117	85	75	5,3	43	28	3—11
Ы 220	85	75	6,0	45	28	3—11

* — проходит государственное сортоиспытание
— низколиноленовый (масло пригодно для использования в пищу)
— зимующий, сорт-двуручка

АВАНГАРД

АВАНГАРД

Устойчивость к засухе и холоду

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8), Уральский (9)

Высокая урожайность и сбор масла с гектара, в том числе в засушливых условиях выращивания, устойчив к болезням и осыпанию
Отличается дружным цветением и созреванием

АВГУСТ

АВГУСТ

Очень высокая устойчивость к фузариозу

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Устойчив к осыпанию и полеганию, выравнен по высоте, цветению и созреванию растений, отзывчив на удобрения и качественную обработку почвы
Пластичен к срокам посева, высокомасличный

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2025 г. **сорт Август** занял **2 место** в рейтинге 10 лидирующих сортов (гибридов) с/х культур с объемом высева семян 5,6 тыс. тонн

АМБЕР

АМБЕР

Низкое содержание линоленовой кислоты в масле — 4,8—6,3 %

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Масло пригодно для использования в пищу
Отзывчив на высокий агрофон, стабилен в стрессовых условиях
Высокоустойчив к фузариозному увяданию, засушливым условиям

АНГЕЛИТ

НОВИНКА!

АНГЕЛИТ

Высокая стабильная урожайность в различных климатических условиях

Проходит государственное сортоиспытание в регионах допуска: Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Западно-Сибирский (10)

Повышенная устойчивость к полевой засухе, полеганию, осыпанию и фузариозному увяданию
Высокое содержание линоленовой кислоты в масле — более 51 %
Слабо реагирует на недостаток влаги в почве

БАРХАН

НОВИНКА!

БАРХАН

Очень высокая устойчивость к засухе

Регионы допуска: Центральный (3), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Устойчив к полеганию, высокотехнологичен
Двойное назначение использования сорта: на масло и волокно
Характеризуется дружным цветением и созреванием, высокой устойчивостью к осыпанию семян

БИРЮЗА

БИРЮЗА

Высокая семенная продуктивность

Регионы допуска: Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Высокомасличный сорт
Содержание линоленовой кислоты в масле более 60 %
Характеризуется высокой адаптивностью к различным климатическим условиям
Имеет высокий потенциал урожайности, отличается стабильностью

ВНИИМК 620 ФН

ВНИИМК 620 ФН

Отсутствие реакции на изменение длины дня

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям, в том числе к умеренным стрессам
Слабо реагирует на недостаток влаги в почве
Отличается отзывчивостью на высокий фон минерального питания

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2025 г. **сорт ВНИИМК 620 ФН** занял **3 место** в рейтинге 10 лидирующих сортов (гибридов) с/х культур с объемом высева семян 3,8 тыс. тонн

ДАНИК

ДАНИК

Максимальная адаптивность к любым условиям выращивания

Регионы допуска: Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Высокая урожайность и масличность
Отзывчив на высокий агрофон
Предназначен для выращивания на масло и волокно

ЛАЗУРИТ

НОВИНКА!

ЛАЗУРИТ

Высокая урожайность и масличность

Проходит государственное сортоиспытание в регионах допуска: Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Западно-Сибирский (10)

Повышенная полевая устойчивость к засухе, осыпанию и полеганию, фузариозному увяданию
Слабо реагирует на недостаток влаги в почве
Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
Устойчив к вредителям и болезням



Нилин

НИЛИН

НИЛИН

Изменённый жирно-кислотный состав масла

- Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Западно-Сибирский (10)
- Высокая оксистабильность за счет низкого содержания линоленовой кислоты в масле (2,9 %)
  Масло пригодно для использования в пищу
  Отзывчив на высокий агрофон
  Устойчив к фузариозному увяданию
  Быстро развивается на ранних этапах вегетации

РАДУГА

РАДУГА

Высокая масличность семян

- Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)
- Устойчив к болезням и полеганию
  Стрессоустойчив
  Отличается высокой технологичностью при возделывании, стабильностью в различных условиях выращивания

РФН

РФН

Пониженная реакция на изменение длины дня

- Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Западно-Сибирский (10)
- Высокопродуктивный высокомасличный сорт
  Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
  Слабочувствителен к недостатку влаги в почве
  Не реагирует на изменение длины дня
  Высокая стабильность в стрессовых условиях

САНИЯ

САНИЯ

Очень высокая масличность семян

- Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Чернозёмный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)
- Содержание линоленовой кислоты в масле 58—61 %
  Высокоустойчив к фузариозу, полеганию и осыпанию
  Обладает экологической пластичностью
  Предназначен для получения высококачественного технического масла
  Имеет высокую стабильность урожайности на разных типах почв и в засушливых условиях

СВЕТЛЯЧОК

СВЕТЛЯЧОК

Высокая семенная продуктивность

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8)

Устойчив к болезням и полеганию
Отзывчив на высокий агрофон
Отличается технологичностью при возделывании, дает высокий экономический эффект в оптимальные сроки посева
Благодаря светлой окраске и высокой масличности семян возможно применение в кондитерской промышленности и хлебопечении

СЕВЕРНЫЙ 22

НОВИНКА!

СЕВЕРНЫЙ 22

Пригоден для выращивания в Сибири

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Хорошо адаптирован к почвенно-климатическим условиям Сибири
Высокоустойчив к фузариозу, полеганию и осыпанию
Предназначен для получения высококачественного технического масла
Создан на основе хорошо зарекомендовавшего себя сорта Северный, обладает улучшенными характеристиками и большей урожайностью

СНЕГУРОК ❄

СНЕГУРОК

Зимующий сорт-двуручка

Регионы допуска: все регионы РФ

Высокопродуктивный среднеспелый сорт
Лучшие результаты показывает на высоком агрофоне
Посев осуществляется в осенний период на юге РФ (конец сентября — середина октября) для получения растений высотой до 5 см (фаза «ёлочки») до наступления зимнего периода
Для выращивания зимующего сорта Снегурок пригодны климатические зоны, в которых температура под снежным покровом не опускается ниже минус 20—23 °С
Как яровая культура выращивается по традиционной технологии

ФИАНИТ

НОВИНКА!

ФИАНИТ

Высокая семенная продуктивность

Регионы допуска: Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8)

Высокая степень адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям
Высокая устойчивость к болезням, полеганию
Сорт предназначен для производства высококачественного масла и волокна
Отзывчив на высокий агрофон, высокотехнологичен

ФЛИЗ

ФЛИЗ

Высокая семенная продуктивность

Регионы допуска: Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10)

Хорошо адаптирован к различным почвенно-климатическим условиям
Отзывчив на высокий агрофон, устойчив к болезням
Стабилен при любых условиях выращивания

По данным ФГБУ «Россельхозцентр», в 2025 г. **сорт ФЛИЗ** занял **8 место** в рейтинге 10 лидирующих сортов (гибридов) с/х культур с объемом высева семян 2,1 тыс. тонн

ФЛИЗ ЗУ

НОВИНКА!

ФЛИЗ ЗУ

Полная устойчивость к засухе

Регионы допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Нижневолжский (8), Уральский (9), Восточно-Сибирский (11)

Высокая степень адаптивности к различным почвенно-климатическим условиям
Засухоустойчивость сорта определяется более глубокой корневой системой
Сорт пригоден для изготовления масла и волокна

Ы 117

Ы 117

Полная устойчивость ко льноутомлению и фузариозному увяданию

Регионы допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Масло пригодно для использования в пищу
Обладает комплексной устойчивостью ко льноутомлению и грибам рода *Fusarium* spp.
Может выращиваться как в короткоротационных (срок возврата 3—4 года) севооборотах, так и при монокультуре
Отличается пониженным содержанием линоленовой кислоты в масле (25,2—27,3 %)

Ы 220

Ы 220

Полная устойчивость ко льноутомлению и фузариозному увяданию

Регионы допуска: Центральный (3), Волго-Вятский (4), Центрально-Черноземный (5), Северо-Кавказский (6), Средневолжский (7), Нижневолжский (8), Уральский (9), Западно-Сибирский (10), Восточно-Сибирский (11)

Масло пригодно для использования в пищу
Может выращиваться как в короткоротационных (срок возврата 3—4 года) севооборотах, так и при монокультуре, в том числе в засушливых условиях
Отличается пониженным содержанием линоленовой кислоты в масле (21,5—23,3 %)

НА ЗАМЕТКУ
Представленные материалы носят информационный характер и основаны на результатах, полученных в оптимальных условиях внутренних и производственных испытаний ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, а также при соблюдении рекомендованных для культуры агротехнологий и агроприемов

ВНИИМК



8 (800) 700-75-85
350038, г. Краснодар,
ул. им. Филатова, д. 17
semena@vniimk.ru
www.vniimk.ru