


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



36 ц/га
потенциальная
урожайность

Раннеспелость и засухоустойчивость


Регион допуска
5, 6

Группа спелости
Очень ранняя

Преимущества

Устойчивость к полеганию растений и растрескиванию бобов, короткий вегетационный период

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию



Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз




Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут.	100 (45°)
Содержание белка, %	43
Масличность, %	23
Масса 1000 семян, г	150
Высота растения, см	75–95
Высота прикрепления нижнего боба, см	13–15

Особенности

Благодаря короткому вегетационному периоду сорт способен «уходить» от засух второй половины лета и формировать урожай до пиков позднелетних засух. Пригоден для возделывания на зерно в основных посевах на широтах до 50–52°

Урожайность в производственных посевах

● **Орловская область**
30,1 ц/га



● **Курская область**
31,4 ц/га

● **Ставропольский край**
29,8 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

8, 12