


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1–2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1–3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



ВНИИМК



РЫСЬ
СОЯ

45 ц/га

потенциальная
урожайность



Устойчивость к засухе и холоду



Регион допуска

6



Группа спелости

Среднеранняя

Преимущества

Отзывчивость на дополнительное увлажнение, повышенная устойчивость к наклону и полеганию растений при избыточном увлажнении

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию



Устойчивость к болезням

Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 120 (45°)

Содержание белка, % 43

Масличность, % 22

Масса 1000 семян, г 180

Высота растения, см 95–105

Высота прикрепления нижнего боба, см 14–16

Особенности

Среднеранний полудетерминантный и крупносемянный сорт с повышенной холодо- и заморозкоустойчивостью (до минус 5 °С) и пониженной реакцией на длину дня. На дополнительное увлажнение отзывается увеличением крупности и массы семян

Урожайность в экологическом сортоиспытании



● Краснодарский край
43,0 ц/га

**Дополнительные зоны
возможного возделывания**

12