


Продолжительность вегетационного периода от всходов до физиологической спелости указана в г. Краснодаре, 45° с. ш., для других регионов России будет увеличиваться на 1-2 дня на каждый градус широты при продвижении с юга на север и уменьшаться на 1-3 дня на каждый градус широты при продвижении на юг

• СОЯ



СЛАВИА[®]
СОЯ



42 ц/га
потенциальная
урожайность



Сверхранние сроки посева,
заморозкоустойчивость (до минус 5 °С)



Регион допуска
5, 6, 8



Группа спелости
Ранняя

Преимущества

Холодоустойчивость,
способность выдерживать
неоднократные ранневесенние
заморозки

Устойчивость к полеганию



Устойчивость к растрескиванию



Устойчивость к болезням


Ложная мучнистая роса



Фузариоз



Аскохитоз



Бактериальная пятнистость



Пепельная гниль



Характеристики

Вегетационный период, сут. 110 (45°)

Содержание белка, % 43

Масличность, % 22

Масса 1000 семян, г 155

Высота растения, см 110-125

Высота прикрепления нижнего боба, см 15-16


Особенности

Всходы выдерживают кратковременные заморозки до минус 4,5-5,0 °С. Засухоустойчивый сорт с очень глубокой корневой системой и центральным корнем до 2,5 м. В Краснодарском крае созревает в III декаде августа - I декаде сентября. В южно-предгорной и центральной зонах региона может высеваться с конца марта - начала апреля. При очень ранних сроках посева (конец марта - начало апреля) созревает в I декаде августа

Урожайность в производственных посевах

● Краснодарский край

36,2 ц/га



● Ставропольский край

33,6 ц/га